

ROTATE[®] PLUS DF

FUNGICIDA IN GRANULI IDRODISPERDIBILI AD ATTIVITA' PREVENTIVA,
CURATIVA ED ERADICANTE PER VITE, FRUTTIFERI ED ALTRE COLTURE

PARTITA N.:

COMPOSIZIONE

g 100 di prodotto contengono:

g 4,5 di tebuconazolo puro

g 70 di zolfo puro

(esente da Selenio)

Coformulanti quanto basta a g 100



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO:

H315 – Provoca irritazione cutanea. H317 – Può provocare una reazione allergica cutanea. H361d – Sospettato di nuocere al feto. H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

P261 – Evitare di respirare gli aerosol. P264 – Lavare accuratamente dopo l'uso. P272 – Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. P273 – Non disperdere nell'ambiente. P280 – Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. P281 – Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. P302 + P352 – In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P308 + P313 – In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P333 + P313 – In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P362 – Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P405 – Conservare sotto chiave. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme locali / nazionali vigenti.



Nufarm Italia S.r.l. Viale Luigi Majno 17/A - MILANO (MI)

Sede operativa: Via Guelfa, 5 – Bologna - Tel. 051 0394022

OFFICINE DI PRODUZIONE:

Sulphur Mills Ltd., 1904/1905, G.I.D.C., Panoli Dist. Bharuch, Gujarat (India)

Contenuto netto: g 50-100-250-500; kg 1-5-10-20

Registrazione Ministero della Salute n. 15177 del 09/05/2011

® marchio registrato Nufarm

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Durante la fase di miscelazione e carico del prodotto usare guanti e tuta da lavoro. Non rientrare zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: **TEBUCONAZOLO 4,5%**, **ZOLFO 70%**, le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

TEBUCONAZOLO: Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite

(nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia: sintomatica.

ZOLFO: non noti

Avvertenza: Consultare un Centro antiveleni.

CARATTERISTICHE : ROTATE[®] PLUS DF è una miscela fungicida a base di tebuconazolo e zolfo, pronta all'uso sotto in una particolare formulazione di microgranuli idrodispersibili. Tale formulazione rende molto agevole la manipolazione del prodotto durante le fasi di preparazione della miscela. ROTATE[®] PLUS DF esalta appieno le proprie caratteristiche quando applicato con criterio preventivo tuttavia risulta efficace anche in modalità curativa ed eradicante (peculiarità sia del tebuconazolo che dello zolfo). La presenza di una quota rilevante di zolfo, oltre a completare lo spettro d'azione della miscela, permette una corretta gestione delle problematiche legate alla potenziale insorgenza di resistenze nei confronti dei fungicidi appartenenti alla famiglia degli inibitori degli steroli (IBS).

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Coltura	Parassita	Dose d'impiego per ettolitro d'acqua	Dose da applicare per ettaro
VITE da vino	Oidio	220 g/hl (0,099 + 1,54 g p.a./l)	2 - 2,2 kg/ha
MELO e PERO	Ticchiolatura	220 - 280 g/hl (0,126 + 1,96 g p.a./l)	3 - 4 kg/ha
PESCO	Oidio, Monilia	280 - 410 g/hl (0,184 + 2,87 g p.a./l)	3 - 4,5 kg/ha
	Bolla	440 g/hl (0,198 + 3,08 g p.a./l)	4,5 - 5 kg/ha
FRUMENTO e ORZO	Oidio, Septoriosi, Ruggini, Fusarium, Mal del piede	1250 g/hl (0,56 + 8,75 g p.a./l)	5 - 5,5 kg/ha
MELONE, ZUCCHINO	Oidio, Ruggini, Stemphylium	280 g/hl (0,126 + 1,96 g p.a./l)	2,5 - 3 kg/ha

Coltura	N. max trattamenti	Volume d'acqua utilizzato (l/ha)
VITE da vino	3	800-1000
MELO, PERO, PESCO	3	1000-1250
FRUMENTO	2	400-600
ORZO	1	400-600
MELONE, ZUCCHINO	4	800-1000

Per melo e pero interrompere le applicazioni quando il diametro dei frutti ha raggiunto la dimensione di 3,5/4 cm (BBCH 75).

Per pesco intervenire al massimo due volte dopo la scamicatura.

Modalità d'impiego: Versare ROTATE[®] PLUS DF direttamente nella botte riempita per ¾ con acqua, mantenendo l'agitatore in funzione; aggiungere poi il rimanente quantitativo d'acqua previsto per l'impiego.

COMPATIBILITA': Il prodotto è compatibile con tutti gli altri prodotti fitosanitari a reazione neutra.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscela compiuta.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 19/05/2014 e modificata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 28/12/2016

INTERVALLO DI SICUREZZA:

- **60 giorni** per melo e pero;
- **35 giorni** per frumento;
- **30 giorni** per vite da vino;
- **7 giorni** per pesco, melone;
- **3 giorni** per zucchini;

Interrompere le applicazioni a fine fioritura su orzo.

ATTENZIONE! DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA: OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del proprietario. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurarsi l'efficacia dei trattamenti e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

ATTENZIONE – Non immettere bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di sicurezza.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO

NELL'AMBIENTE

NON OPERARE CONTRO VENTO

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.