

CHANON

ERBICIDA DI PRE EMERGENZA SELETTIVO PER PATATA, GIRASOLE, PISELLO ED ALTRI LEGUMI DA GRANELLA

CHANON

Composizione

100 grammi di prodotto contengono

ACLONIFEN puro g 49,73 (= 600 g/l)
Coformulanti q.b. a g 100

Indicazioni di pericolo

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea - **H351** Sospettato di provocare il cancro
- **H410** Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata - **EUH 401** Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso

Consigli di Prudenza

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini - **P201** Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso - **P261** Evitare di respirare gli aerosol - **P270** Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso - **P273** Non disperdere nell'ambiente - **P280** Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso - **P308 + P313** IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico - **P363** Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente - **P391** Raccogliere il materiale fuoriuscito - **P501** Smaltire il prodotto/recipiente secondo quanto previsto dalla normativa vigente sui rifiuti pericolosi.

Titolare della Registrazione

Globachem NV – Brustem Industriepark • Lichtenberglaan 2019 3800 Sint-Truiden (Belgio) tel. +32 11 78 57 17

Distribuito da:

Belchim Crop Protection Italia S.p.A. – Viale Milanofiori Strada 6 Palazzo N3 - 20089 Rozzano (MI)

Officine di produzione

Phyteurop - ZI de Champagne 49260 Montreuil-Bellay (Francia)

Schirm GmbH - Geschwister-Scholl-Strasse 127 D-39218 Schönebeck (Germania)


Kwizda Agro GmbH - Werk Leobendorf, Laaer Bundesstraße/Kwizda Allee 1 - 2100 Leobendorf – Austria.

AgroSmart LTD – Unit 1C Victoria Court, Colliers Way, Clayton West, HD8 9TR Huddersfield, West Yorkshire (Regno Unito)

Registrazione del Ministero della Salute n. 16694 del 26/02/2019

Contenuto netto: litri 1, 2, 3, 5, 10 15, 20

Partita n.



ATTENZIONE

Prescrizioni supplementari: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque delle aziende agricole e delle strade. Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una zona cuscinetto non trattata di 20 metri dai corpi idrici superficiali. Per proteggere le piante non bersaglio rispettare una zona cuscinetto non trattata di 5 metri dalla vegetazione naturale.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** Consultare un centro antiveleni

Misure di Pronto Soccorso

Non somministrare nulla per bocca a persone prive di conoscenza. In caso di malessere consultare un medico (se possibile mostrargli l'etichetta).

In caso di contatto con gli occhi: sciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e se possibile senza difficoltà. Continuare a sciacquare. Contattare un medico se persiste dolore, ammiccamento o rossore.

In caso di contatto con la pelle: rimuovere gli indumenti contaminati e lavare tutte le parti di pelle esposta con sapone neutro e acqua; sciacquare quindi con acqua tiepida. Lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Se persiste irritazione o eruzione della pelle consultare un medico. Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.

In caso d'ingestione: sciacquare la bocca. NON indurre il vomito. Contattare un Pronto Soccorso.

In caso d'inalazione: trasportare l'infortunato all'aria aperta. Mantenere a riposo.

CARATTERISTICHE E MODALITÀ D'AZIONE

CHANON è un diserbante in sospensione concentrata a base di Aclonifen, appartenente alla famiglia delle fenossi-aniline con meccanismo d'azione [gruppo HRAC]: F3, selettivo per le colture di girasole, patata, pisello ed altri legumi da granella. Il prodotto viene assorbito dall'apparato fogliare delle infestanti ed il suo effetto si manifesta con clorosi, rallentamento dell'accrescimento ed infine il disseccamento. Le lavorazioni meccaniche influenzano negativamente l'effetto diserbante.

ISTRUZIONI PER L'USO:

CHANON è efficace contro le seguenti infestanti dicotiledoni:

Pre emergenza - Cardo campestre (*Cirsium arvense*), Viola dei campi (*Viola arvensis*), Mercorella (*Mercurialis annua*), Colombina cava (*Corydalis cava*), Attaccamani (*Galium aparine*), Ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*), Farinaccio (*Chenopodium album*), Centocchio (*Stellaria* spp.), Amaranto (*Amaranthus* spp.), Falsa camomilla (*Anthemis arvensis*), Atriplice (*Atriplex* spp.), Poligono nero (*Polygonum convolvulus*).

Post emergenza - Ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*), Farinaccio (*Chenopodium album*), Amaranto (*Amaranthus* spp.), Poligono nero (*Polygonum convolvulus*).

Controlla anche alcune infestanti annuali come Giavone comune (*Echinochloa crus-galli*), Sanguinella (*Digitaria sanguinalis*).

PATATA

applicare CHANON in pre emergenza, almeno 5 giorni prima dell'emergenza

Dose d'impiego: 3 litri/ha in 150-500 litri d'acqua.

Numero di applicazioni: 1/anno.

Misure di riduzione della deriva: fascia vegetativa di 20 metri

PISELLO ED ALTRI LEGUMI DA GRANELLA:

applicare CHANON in pre emergenza

Dose d'impiego: 3 litri/ha in 150-500 litri d'acqua.

Numero di applicazioni: 1/anno.

Misure di riduzione della deriva: fascia vegetativa di 20 metri

GIRASOLE

applicare CHANON in pre o post-emergenza.

Dose d'impiego: in pre-emergenza 3 litri/ha in 150-500 litri d'acqua.

in post-emergenza (2-4 foglie vere) 1,5 litri/ha in 150-500 litri d'acqua.

Numero di applicazioni: 1/anno.

Misure di riduzione della deriva: fascia vegetativa di 20 metri

Attenzione: l'uso improprio (applicazioni tardive, condizioni climatiche avverse come pioggia insistente) possono danneggiare il raccolto. Il deflusso idrico dal terreno in pendenza può portare ad un accumulo locale di Aclonifen che può danneggiare colture limitrofe sensibili. Non è stata osservata sensibilità correlata al trattamento. Per prevenire la comparsa di infestanti resistenti è necessario miscelare o alternare il prodotto con erbicidi caratterizzati da diverso meccanismo di azione.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Agitare bene prima dell'uso. Riempire il serbatoio dell'irroratrice con 2/3 della quantità di acqua necessaria. Versare la quantità indicata di CHANON mescolando accuratamente quindi riempire fino al volume finale. Mantenere l'agitatore in funzione durante il trattamento. Sciacquare accuratamente con acqua i contenitori vuoti del prodotto e versare l'acqua di risciacquo nell'irroratrice.

TECNICHE D'APPLICAZIONE

Utilizzare solo atomizzatori ed ugelli adatti all'uso previsto, approvati e regolarmente ispezionati dagli organi di controllo ed in piena efficienza. Evitare deriva e sovradosaggio. Diluire ogni volume d'applicazione residuo in proporzione 1:10 e spargerlo sull'area precedentemente trattata.

COLTURE SUCCESSIVE

In caso di fallimento della coltivazione possono essere seminati in coltura successiva, senza alcun periodo di attesa e dopo una lavorazione superficiale del terreno, girasole, mais, patate, fave e cotone. Possono essere coltivate anche cipolla, frumento, orzo e soia se viene effettuata una lavorazione del terreno per una profondità di almeno 20 cm.

COMPATIBILITÀ: CHANON può essere miscelato con gli altri erbicidi comunemente usati nel diserbo delle colture indicate. **AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Il prodotto è fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

ATTENZIONE

- **Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate nella presente etichetta**
- **Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato**
- **Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali**
- **Non applicare con mezzi aerei**
- **Da non vendersi sfuso**
- **Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua**
- **Operare in assenza di vento**
- **Il contenitore non può essere riutilizzato**
- **Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente**