

KENJA®

(SOSPENSIONE CONCENTRATA)

Fungicida per il controllo della botrite di vite da vino e da tavola e della fragola e della monilia di ciliegio e albicocco.
Meccanismo d'azione FRAC 7

KENJA - Registrazione Ministero della Salute n. 16858 del 31/03/2020

Composizione:
ISOFORMATID puro g 36 (=400 g/L)
Coformulanti g.b.a g 100

Contenuto:

0,2-0,5-1-3-5-10-20 L

Partita n°

INDICAZIONI DI PERICOLO: H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.

REAZIONE: P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. EUH208 Contiene 1,2-benzisotiazol-3-one. Può provocare una reazione allergica. EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.

Pegasus Park, De Kleetlaan 12B, Bus 9

B-1831 Diegem (Belgio)

Tel. 0032-2-6278611

Stabilimenti di produzione:

Phyteurop S.A. - Rue Pierre Vly, Z.I. Grande Champagne
49260 Montreuil Bellay - Francia

Solfotecnica Italiana SpA

Via Evangelista Torricelli 2, 48010 Cotignola (RA)

Ishihara Sangyo Kaisha Ltd.

Ishihara-cho, Yokkachi-shi, Mie 510-0842, Giappone

IBC Manufacturing CO.

416. E Brooks Road, Memphis, TN 38109, USA

distribuito da:

Belchim Crop Protection Italia S.p.A.

Viale Milanoforì, Strada 6, Palazzo N3 - 20089 Rozzano (MI) - Tel. 02-33599422

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Indossare guanti adatti durante la raccolta manuale della fragola. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

KENJA è un fungicida ad attività transliniare che agisce per contatto sulle ife, sul micelio e sulle spore di *Monilia* e *Botrite* inibendo la sporulazione, la germinazione e la crescita del micelio.

I migliori risultati si ottengono effettuando trattamenti preventivi ai manifestarsi delle concidioni favorevoli allo sviluppo delle malattie, quando la pianta si trova nello stadio di sviluppo sotto specificato.

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Vite da vino e da tavola: contro *Botrite (Botrytis cinerea)*.

Effettuare i trattamenti alla dose di 1,5 litri ad ettaro corrispondenti a 0,187-1,5 L. di prodotto per ettolitro, utilizzando rispettivamente 800 e 100 litri di acqua/ha. Intervenire al manifestarsi delle concidioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia, quando la vite si trova tra lo stadio di inizio fioritura e quello di addorciamento degli acini (BBCH 61-85). Effettuare un solo trattamento per anno.

Fragola (in campo): contro *Botrite (Botrytis cinerea)*.

Effettuare i trattamenti alla dose di 1,2 litri ad ettaro corrispondenti a 150-300 ml di prodotto per ettolitro, utilizzando rispettivamente 800 e 400 litri di acqua/ha.

Intervenire al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia a partire da inizio fioritura fino in prossimità della raccolta (BBCH 60-87).

Effettuare massimo 2 trattamenti/anno ad un intervallo di 7-10 giorni.

Ciliegio e albicocco: contro *Monilia sp.* che attacca fiori e germogli effettuare i trattamenti alla dose di 0,8 L/ha corrispondenti a 80-160 ml di prodotto per ettolitro, utilizzando rispettivamente 1000 e 500 litri di acqua/ha. Intervenire al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia tra inizio fioritura e fine della fioritura (BBCH 57-69) effettuando massimo 2 trattamenti/anno distanziati di almeno 9 giorni.

Con alte pressioni delle malattie, con forti precipitazioni o con rapida crescita della vegetazione si raccomandano le dosi più alte e gli intervalli più brevi.

Su tutte le colture, in caso di impiego di volumi d'acqua diversi da quelli indicati, adattare la dose di prodotto per ettolitro al fine di distribuire la stessa quantità di prodotto per ettaro.

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DI IRRORAZIONE

Riempiere il serbatoio dell'irroratrice con il 50% di acqua, mettere in funzione l'agitatore ed aggiungere la quantità prevista di prodotto, quindi aggiungere altra acqua fino al volume desiderato mantenendo la massa in agitazione fino al completamento del trattamento

AVVERTENZA: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione completa.

GESTIONE DELLA RESISTENZA

L'impiego ripetuto nella stessa area di prodotti appartenenti alla stessa famiglia chimica o che presentano lo stesso meccanismo d'azione può far emergere fenomeni di resistenza. Per evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di ceppi resistenti si consiglia di alternare l'impiego del prodotto con preparati aventi un diverso meccanismo d'azione, ripartendo le limitazioni nel numero di trattamenti indicate dal FRAC in maniera complessiva per i diversi prodotti SDHI e di adottare, laddove possibile, la rotazione colturale.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

- Generalmente piogge cadute entro 1 ora dal trattamento non interferiscono con i risultati. Solo in caso di forti precipitazioni (> di 10 mm/ora) è necessario ripetere il trattamento.

- Il prodotto non ha effetti negativi nei riguardi degli atropodi utili. Su colture in fiore si raccomanda di effettuare i trattamenti la sera tardi o la mattina presto, quando le api non sono in attività.

- Il prodotto non ha alcun effetto negativo sulla fermentazione dei mosti, sulla qualità del vino e dei prodotti trasformati provenienti da colture trattate.

- Utilizzare la soluzione di irrorazione entro 24 ore dalla preparazione. Bagnare accuratamente ed uniformemente la vegetazione da proteggere.

- KENJA deve essere applicato preventivamente.

- Rispettare il numero massimo di applicazioni per anno

Sospendere i trattamenti 1 giorno prima della raccolta della fragola; 21 giorni prima della raccolta di vite. Su ciliegio e albicocco sospendere i trattamenti a fine fioritura.

COMPATIBILITÀ

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione completa.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

CONSERVARE AL RIPARO DAL GELO

AGITARE A FONDO LA CONFEZIONE PRIMA DELL'USO

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

© Marchio registrato Ishihara Sangyo Kaisha Ltd. (Giappone)

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 31/03/2020