

TWINGO

(Microgranuli idrodispersibili)

**Fungicida organico per la difesa della vite da tavola e da vino
contro Peronospora**

Cymoxanil MoA 27; Folpet MoA M4

TWINGO

Composizione:

- FOLPET puro g. 33,4
- CIMOXANIL puro g. 4,0
- Coformulanti q.b. a g 100

INDICAZIONI DI PERICOLO

H317. Può provocare una reazione allergica cutanea; H319. Provoca grave irritazione oculare. H351. Sospettato di provocare il cancro. H361 - Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto. H410. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P201 - Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso/proteggere l'udito P308+313. IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P333+313 - In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. P337+313 - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P363 - Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente. P391. Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501. Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.



ATTENZIONE

Belchim Crop Protection NV/SA

Technologielaan 7

1840 Londerzeel – Belgio

Tel +32 (0)52 300906

Distribuito da:

Belchim Crop Protection Italia S.p.A.

Viale Milanofiori, Strada 6, Palazzo N3 - 20089 Rozzano (MI)

Tel. 02 33599422

Autorizzazione Ministero della Salute n 15743 del 16 settembre 2016

Stabilimento di produzione:

S.T.I. – SOLFOTECNICA ITALIANA SpA

Via Evangelista Torricelli, 2 – 48121 Cotignola (RA)

Contenuto: 0.125 – 1 – 3--5 – 10 kg

Partita n.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una zona non trattata di 12 metri da corpi idrici superficiali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: **CIMOXANIL 4% e FOLPET 33.4% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:**

CIMOXANIL – Derivato dell'urea. Sintomi: durante l'impiego può provocare congiuntivite, rinite, nonché irritazione della gola e della cute. L'ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed ematuria.

FOLPET – Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntivite, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento dell'apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemie e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).

Terapia: sintomatica

Avvertenza: consultare un Centro Antiveneni.

CARATTERISTICHE:

TWINGO è un fungicida in granuli idrodispersibili efficace contro la Peronospora (*Plasmopara viticola*) della vite da tavola e da vino. Il prodotto agisce sia penetrando nelle foglie che per contatto diretto, controllando in questo modo il micelio nei primissimi stadi di sviluppo e le zoospore germinanti. **TWINGO** può essere impiegato nei calendari antiperonosporici per tutta la stagione non causando fenomeni di fitotossicità, rallentamento o riduzioni vegetative.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

VITE da tavola e da vino

Contro peronospora (*Plasmopara viticola*): 0.3 kg/hL (3 kg/ha) distribuiti con volumi d'acqua di 1000 L/ha. Iniziare i trattamenti non appena la vite abbia raggiunto lo stadio vegetativo (foglie distese) in cui inizia il pericolo di infezioni peronosporiche e proseguirli ad intervalli di 7-10 giorni fino a 28 giorni prima della raccolta per la vite da vino e fino a fine fioritura per le uve da tavola. In caso di forte pressione della malattia intervenire ogni 7 giorni. Per evitare fenomeni di resistenza, effettuare massimo 3 trattamenti all'anno e alternarlo con prodotti aventi un diverso meccanismo di azione (MoA).

ISTRUZIONI PER LA PREPARAZIONE DELLA MISCELA:

Versare la giusta dose di prodotto nel serbatoio dell'irroratrice riempito a metà con acqua e mantenendo in agitazione la massa, aggiungere il restante quantitativo di acqua fino al volume desiderato.

COMPATIBILITÀ

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto per vite da vino; non applicare dopo lo stadio BBCH69 per vite da tavola.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d'acqua. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.