

# VIDERYO F

(SOSPENSIONE CONCENTRATA)  
Fungicida per la lotta contro la  
Peronospora della vite (*Plasmopara viticola*)  
Meccanismi d'azione FRAC 21 + M04

VIDERYO F Registrazione Ministero della Salute N. 15715 del 07/09/2021

Composizione:

CYAZOFAMID puro	g 3,2 (= 40 g/L)
FOLPET puro	g 32 (= 400 g/L)
Coformulanti* q,b,a	g 100

\*Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one



**ISK BIOSCIENCES EUROPE N.V.**  
Pegasus Park, De Kleetlaan 12B, Bus 9  
B-1831 Diegem (Belgio)

distribuito da:

**Belchim Crop Protection Italia S.p.A.**

Viale Milanofiori, Strada 6, Palazzo N3 - 20089 Rozzano (MI) - Tel. 02 33599422

CONTENUTO: 1-2,5-5-10-20 L

Partita n°.....

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H332 Nocivo se inalato. H351 Sospettato di provocare il cancro. H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

**PREVENZIONE:** P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. P261 Evitare di respirare gli aerosol. P273 Non disperdere nell'ambiente. P280 Indossare guanti e indumenti protettivi.

**REAZIONE:** P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone. P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE:

Trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. P308+P313 In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P312 Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico in caso di malessere. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P362+P364 Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

**SMALTIMENTO:** P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:** EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Stabilimento di produzione:

**PHYTEUROP - Z.I. de Champagne, F-49260 Montreuil-Bellay (Francia)**

## PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata dai corpi idrici superficiali di 20 m. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Agitare prima dell'uso. Non rientrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia completamente asciutta.



**ATTENZIONE**

## INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: CYAZOFAMID 3,2% e FOLPET 32% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

**CYAZOFAMID: ----**

**FOLPET: Sintomi:** irritante per cute e mucose (congiuntiviti, rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento del SNC con irritabilità o depressione; possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine).

**Terapia sintomatica**

**Avvertenza: consultare un Centro Antiveleli.**

## CARATTERISTICHE

VIDERYO F è un fungicida per il controllo della Peronospora della vite (*Plasmopara viticola*).

Agisce per contatto distruggendo e/o inibendo la germinazione delle spore.

Si consiglia un uso preventivo de VIDERYO F, nei periodi critici di sviluppo della malattia.

## EPOCHE, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

**UVA DA TAVOLA E DA VINO:** contro Peronospora della vite (*Plasmopara viticola*) 2,0 - 2,5 litri/ha (200-1250 ml/hl) utilizzando volumi d'acqua di 200-1000 L/ha.

Iniziare gli interventi quando la vite si trova nello stadio di 4-6 foglie distese al manifestarsi delle condizioni climatiche favorevoli allo sviluppo della malattia. Effettuare massimo 3 applicazioni/anno su vite da vino e massimo 2 applicazioni/anno su vite da tavola ad intervalli di 10-12 giorni a secondo della pressione della malattia. Con alta pressione della Peronospora, con forti precipitazioni o con rapida crescita della vegetazione si consiglia di usare la dose più alta ed accorciare l'intervallo tra i trattamenti.

Utilizzare volumi di soluzione sufficienti ad assicurare una omogenea e completa bagnatura della vegetazione evitando lo sgocciolamento. In caso di impiego di volumi d'acqua diversi da quelli sopra indicati, adeguare la dose per ettolitro in modo tale da distribuire la stessa quantità di prodotto per ettaro.

**AVVERTENZE AGRONOMICHE:** Il prodotto non ha alcun effetto sulla fermentazione dei mosti e sulla qualità dei vini. VIDERYO F non ha alcun effetto negativo nei confronti delle popolazioni di acari utili.

## GESTIONE DELLA RESISTENZA

Applicare il prodotto alle dosi, nelle epoche e secondo le modalità indicate nella presente etichetta. Per ridurre il rischio di insorgenza di resistenza è opportuno alternare i trattamenti con VIDERYO F con altri preparati a diverso meccanismo d'azione.

## PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare. Riempire il serbatoio con acqua fino a metà. Mettere in moto l'agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose di prodotto necessaria. Continuando ad agitare la soluzione, aggiungere acqua sino al volume previsto per l'applicazione. Dopo l'applicazione è buona pratica pulire l'attrezzatura con acqua ed un idoneo detergente.

## COMPATIBILITÀ

VIDERYO F è compatibile con gli insetticidi e fungicidi di comune impiego. In caso di miscela estemporanea con altri formulati, effettuare comunque preventivamente un test di compatibilità fisico-chimica.

**Avvertenza:** In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

**Sospendere i trattamenti 28 giorni prima della raccolta su UVA DA VINO; 70 giorni su UVA DA TAVOLA.**

## ATTENZIONE

**Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta**

**Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato**  
**Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.**

**NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**

**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA**

**OPERARE IN ASSENZA DI VENTO**

**DA NON VENDERSI SFUSO**

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**  
**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**